CUIDADO & SALUD PÚBLICA
Revista Científica / Scientific Journal Public Health and Care

EDITORIAL

REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19 EXPERIMENTADA

REFLECTIONS ON THE HEALTH CRISIS EXPERIENCED BY COVID-19

Anika Remuzgo Artezano[1]

[1]*Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Emergencia pediátrica. Lima Perú.*

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo
Recibido: 18/07/2022
Aprobado: 15/11/2022
Publicado: 30/12/2022

Autor corresponsal
Anika Remuzgo Artezano
anika.remuzgo.enfermeria@gmail.com

Financiamiento
Autofinanciado

Conflictos de interés
La autora declara no tener conflictos de interés

Citar como
Remuzgo Artezano. A Reflexiones sobre la crisis sanitaria por COVID-19 experimentada. Rev. Cient. Cuidado y Salud Pública 2022; 2(2): 1-2. DOI: https://doi.org/ 10.53684/csp.v2i2.46

Esta obra tiene una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 Internacional

La pandemia de COVID-19 ha tenido en vilo y consumido a los enfermeros durante más de 2 años. Los enfermeros estuvieron y siguen estando en el centro de la respuesta a la pandemia: El enfermero es fundamental para impulsar las actividades preventivas, curativas y paliativas asociadas con la COVID-19, señalar que han asumido nuevos roles además de sus roles habituales. Los enfermeros de todos los niveles y etapas profesionales han respondido al llamado y se han visto afectados por la pandemia, desde estudiantes en formación hasta enfermeros que realizan roles académicos y ejecutivos [(1-2)].

A pesar de los desafíos y el impacto negativo de la pandemia se encontró que la mayoría de enfermeros que se desempeñan en primera línea demostraron un fuerte compromiso profesional y tenían la disposición de continuar con el cuidado a la población, durante la pandemia, a pesar de las carencias que se presentaron en cuanto a recursos logísticos y humanos [(3)].

Ante ello, los gestores de las instituciones de salud deben ser sensibles para comprender el sufrimiento psíquico/emocional que enfrentan, o que enfrentarán, los trabajadores enfermeros, proporcionando espacios de diálogo destinados a mejorar y mantener la salud mental/emocional de estos trabajadores. La evidencia señala que después de un tiempo de enfrentar la pandemia, los profesionales de enfermería experimentaron un empeoramiento de su salud mental/emocional. La incertidumbre vivida, el deterioro del escenario del sistema de salud, alto riesgo de contagio y repercusiones de la enfermedad en la vida profesional y personal, fueron algunos de los factores que generaron desequilibrios emocionales en un numero importante de profesionales enfermeros [(4)].

Señalar también que esta pandemia dejo algunos aspectos positivos dentro de un escenario difícil y adverso en muchos momentos para todos. En el contexto de la COVID-19, complementar la formación académica y la formación de los estudiantes de enfermería con experiencia en la práctica clínica en los centros de atención en salud públicos, mejoró las capacidades de los futuros enfermeros. Aumentó la confianza en su trabajo y responsabilidades en un escenario difícil lleno de retos [(5)].

También señalar y resaltar los esfuerzos de las naciones por vacunar a su población. La vacunación es fundamental para controlar la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el progreso de la vacunación contra la COVID-19 varía según los países, y la inequidad mundial en materia de vacunas ha sido un problema de salud pública mundial. El mundo enfrentará un mayor desafío para controlar la pandemia si los países con menor nivel de vacunación no aumentan su cobertura de vacunación. Abordar el problema de la inequidad de las vacunas requiere la cooperación [(6)].

La pandemia nos deja lecciones para reflexionar y aprender. Fortalecer el sistema de salud precario con el que contamos, es uno de los puntos a mejorar, para así evitar la alta tasa de mortalidad presentada en esta crisis sanitaria. En cuanto a la mortalidad generada por la pandemia en nuestro país, un estudio señala que Hubo heterogeneidad en la mediana

de edad de las muertes por todas las causas en Perú durante las diferentes oleadas de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Antes del predominio de la variante Omicron, la mediana de edad de las muertes era más baja de lo normal durante los picos de mortalidad diaria por todas las causas. Sin embargo, esto aumentó por encima de lo normal cuando predominaba la variante Omicron. También se investigaron los patrones diarios de muertes por causa específica relacionadas directa e indirectamente con el COVID-19 en Perú. La mayoría de las muertes en exceso relacionadas indirectamente con la COVID-19 fueron causadas principalmente por enfermedades del sistema circulatorio, posiblemente debido a la interrupción de los servicios médicos, y la mayoría de las muertes en exceso relacionadas directamente con la COVID-19 fueron causadas principalmente por la COVID-19 y las enfermedades del sistema circulatorio. sistema respiratorio [7].

Finalmente señalar que toda atención en salud debe ser integral y de calidad. La evaluación de la calidad de la atención en salud brindada durante la pandemia es un proceso complejo en el que la evaluación de los cambios en los indicadores de calidad juega un papel central y crucial. Evaluar los cambios en los indicadores de calidad es fundamental para abordar las diferencias en la calidad general de la atención brindada a la población y para garantizar un alto nivel de atención, especialmente cuando el sistema de salud se ve afectado por una pandemia [8].

En nuestro país se deben realizar esfuerzos para implementar un sistema de salud pública con una significativa capacidad resolutiva en beneficio de la población. A pesar de la pandemia y muchos diagnósticos realizados a nivel de gestión en salud, en muchos lugares se continúa atendiendo pacientes en del siglo XXI con recursos del siglo XX [9].

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Debra J. Reflections on nursing research focusing on the COVID-19 pandemic. J Adv Nurs [revista en Internet] 2022 [acceso 10 de julio de 2022]; 78(7): e84-e86. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9347504/pdf/JAN-78-e84.pdf
2. Ridell K, Bignell L, Bourne D, Boyd L, Crowe S, Cucanic S, et al. The context, contribution and consequences of addressing the COVID-19 pandemic: A qualitative exploration of executive nurses' perspectives. J Adv Nurs [revista en Internet] 2021 [acceso 12 de julio de 2022]; 78(7): 2214-2231. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9111415/pdf/JAN-78-2214.pdf
3. Ke Q, Chan S, Kong Y, Fu J, Li W, Shen Q, et al. Frontline nurses' willingness to work during the COVID-19 pandemic: A mixed-methods study. J Adv Nurs [revista en Internet] 2021 [acceso 15 de julio de 2022]; 77(9): 3880-3893. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8447129/pdf/JAN-77-3880.pdf
4. Duarte M, Silva D, Almeida T, Bombardi I, Fidélis B, Bagatini M. One year of pandemic: how is the mental health of nursing professionals?. Rev Gaucha Enferm [revista en Internet] 2022 [acceso 20 de julio de 2022]; 43(1): 1-6. Disponible en: https://www.scielo.br/j/rgenf/a/FZwQMv8Dq5tGLqJCyNKFKct/?lang=en
5. Choi Y, Um Y. Student nurse experiences in public healthcare clinical practice during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Nurse Educ Today [revista en Internet] 2022 [acceso 13 de julio de 2022]; 119(1): 1-7. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9529338/pdf/main.pdf
6. Ning C, Wang H, Wu J, Chen Q, Pei H, Gao H. The COVID-19 Vaccination and Vaccine Inequity Worldwide: An Empirical Study Based on Global Data. Int J Environ Res Public Health [revista en Internet] 2022 [acceso 14 de julio de 2022]; 19(9): 1-13. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9102773/pdf/ijerph-19-05267.pdf
7. Cajachagua K, Quezada H, Huayanay C, Obeso J, Peña V, Vidal E, et al. COVID-19 and drivers of excess death rate in Peru: A longitudinal ecological study. Heliyon [revista en Internet] 2022 [acceso 18 de julio de 2022]; 8(12): 1-10. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9710104/pdf/main.pdf
8. Konson A, Kuniavsky M, Bronshtein O, Goldschmidt N, Hanhart S, Mahalla H, et al. Quality of care indicator performance was minimally changed in 2020 despite the COVID-19 pandemic. Isr J Health Policy Res [revista en Internet] 2022 [acceso 20 de julio de 2022]; 11(1): 1-8. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8802543/pdf/13584_2022_Article_516.pdf
9. Soto A. Barreras para una atención eficaz en los hospitales de referencia del MiNSA: atendiendo pacientes en el siglo XXI con recursos del siglo XX. Rev. perú. med. exp. salud publica [revista en Internet] 2019 [acceso 26 de julio de 2022]; 36(2): 304-311. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342019000200020